



НАСІННЯ до сезону 2020

www.rwa-ukraine.com.ua



З 2017 року ТОВ "РВА Україна" є дочірньою компанією "RWA Raiffeisen Ware Austria AG" (RWA). RWA - це історія з багатовіковим європейським досвідом. Однією з основних напрямків діяльності компанії є селекція та виробництво насіння. Крім того, група компаній RWA продає сільськогосподарські продукти та матеріали для виробництва енергії, будівельних матеріалів та виробів для всього будинку та саду. RWA є частиною оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарської техніки та запасних частин.

Ми оптово-сервісна компанія для українських фермерів та інших партнерів у всьому виробничому процесі з насінням. RWA має власну селекцію, виробництво і розподіл насіння. Наша сила - це дослідження та розробка в галузі нових сортів сільськогосподарських культур. Ми пропонуємо на українському ринку насіння кукурудзи, соняшнику, сої, озимої пшениці, озимого ячменю, вівса, гарбуза і різних сумішей трав і т.д.

Крім України RWA-філії розташовані в Словаччині, Угорщині, Словенії, Сербії, Хорватії, Румунії та створені спеціально для збуту наших сортів, гібридів і інших продуктів в цих країнах.

Контактні особи




Др. Дворнік Віталій
Генеральний директор

тел.: +38 050 492 92 42
vitaliy.dvornik@rwa-ukraine.com.ua



Васільєв Василь
Менеджер з продажу насіння

тел.: +38 099 222 53 63
vasyl.vasiliev@rwa-ukraine.com.ua



Рибіцький Максим
Менеджер з реєстрації сортів рослин

тел.: +380 50 465 91 35
maxim.rybitsky@rwa-ukraine.com.ua



ЗМІСТ:

Кукурудза

Оханна	5
Гебалот	6
Мелонга	7
Балерина	8
Глуманда	9
Фортеза	10
Зірікус	11
Айован	12
Інклюзив	13

Соняшник

Патріція КЛ	15
Сілуєт	16

Ячмінь ярий

Сербінетта	19
------------	----

Озимий ячмінь

Азра	20
------	----

Озима пшениця

Апостел	21
Еміліо	22
Емеріно	23
Тенор	24

Ярий овес

Ерл	25
-----	----

Озиме жито

Еліас	26
-------	----

Просо

Корнбергер	27
------------	----

Горох

Лессна	28
--------	----

Соя

ГЛ Мелані	29
Сільвія ПЗО	30

Боби

Алексія	31
---------	----

Голонасінний гарбуз

ГЛ Рустікал	33
ГЛ Класік	34
Гляйсдорфер Олкюрбіс	35

КУКУРУДЗА





ОХАННА

Кукурудза ФАО 240



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока та стабільна врожайність зерна
- ♦ швидкий розвиток на початку вегетації
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспоріозу
- ♦ добре пристосований до сухих регіонів

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Група стиглості	середньоранній
Тип гібриду	3-лінійний гібрид
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунта: не піщаний.

Рекомендована густина посіву 75 – 80 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	2
Висота рослини	4
Ламкість стебла	4
Днів від висіву до цвітіння	65 – 72
Придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз стебла	4
Гельмінтоспоріоз	3
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3
Стійкість до вилягання	3
Посухостійкість	1
Холодостійкість	2

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	16 – 18
-----------------------	---------



ГЕБАЛОТ

Кукурудза ФАО 260



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ потужні рослини
- ◆ широкі листя
- ◆ стресостійкий
- ◆ посухостійкий

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунта: не піщаний.

Рекомендована густина посіву 75 – 80 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	3
Висота рослини	3
Ламкість стебла	3
Днів від висіву до цвітіння	72 (70 - 72)
Придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз зерен	2
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3
Стійкість до вилягання	2
Холодостійкість	1

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	16 – 18
-----------------------	---------



МЕЛОНГА

Кукурудза ФАО 270



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ гарно наповнені качани
- ♦ дуже швидкий розвиток на початку вегетації

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Тип гібриду	простий
Використання	зерно
Тип зерна	Зубоподібний

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунта: різні.

Рекомендована густина посіву 75 – 80 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	1,5
Висота рослини	3
Ламкість стебла	2
Днів від висіву до цвітіння	73 (68 - 75)
Придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	16
-----------------------	----

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз зерен	3
Фузаріоз стебла	4
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3
Стійкість до вилягання	3
Посухостійкість	4
Холодостійкість	2



БАЛЕРИНА

Кукурудза ФАО 280



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ потужний ріст та хороша морозостійкість на ранніх стадіях розвитку
- ♦ посухостійкість завдяки добре розвиненій кореневій системі
- ♦ стійкість до гнилі початків та стебла
- ♦ відмінна вологовіддача, тонка серцевина, велике зерно

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Група стиглості	середньоранній
Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тривалість вегетаційного періоду для зони Степу становить 113 днів, для зони Лісостепу — 125 днів.

Тип ґрунтів: різні.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Висота кріплення качана	75 - 80 см
Висота рослини	200 - 220 см

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	16 - 18
-----------------------	---------

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	1,5
Летюча сажка	1,5
Стійкість до вилягання	1
Посухостійкість	1,5
Холодостійкість	1

Примітка:

Майже не уражується іржею та летючою сажкою, ураження пухирчастою сажкою на поодиноких рослинах. Урожай, отриманий при випробуванні гібриду на полі Хмельницького ДЦЕСР, склав 115,6 ц/га; Костянтинівської сортостанції Донецького ДЦЕСР — 135 ц/га; Іршавської ДСС Закарпатського ДЦЕСР — 127,8 ц/га.



ГЛУМАНДА

Кукурудза ФАО 300



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока посухостійкість за різних умов вирощування
- ♦ відмінна стійкість до вилягання
- ♦ потужні коренева система та стебла

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунту: різні.

Рекомендована густота посіву 80 – 85 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	2
Висота рослини	5
Ламкість стебла	2
Днів від висіву до цвітіння	76 (68 - 85)
Придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз зерен	3
Фузаріоз стебла	3
Гельмінтоспоріоз	2
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2
Стійкість до вилягання	2,5
Посухостійкість	2
Холодостійкість	1

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	18 - 22
-----------------------	---------



ФОРТЕЗА

Кукурудза ФАО 340



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ якісний гібрид подвійного призначення;
- ♦ адаптований для виробництва біогазу;
- ♦ висока якість зерна;
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспоріозу;
- ♦ щільне наповнення качана з напіввідкритими обгортковими пелюстками;
- ♦ міцна рослина і потужна коренева система.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубовидний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тривалість вегетаційного періоду для зони Степу становить 123 дні, для зони Лісостепу — 129 днів.

Рекомендована густина посіву 70–75 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Висота кріплення качана	115 см
Висота рослини	200 - 226 см
Придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	16
-----------------------	----

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз	1
Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	1
Стійкість до вилягання	1
Посухостійкість	2
Холодостійкість	2



ЗІРІКУС

Кукурудза ФАО 350



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ якісний гібрид подвійного призначення;
- ♦ адаптований для виробництва біогазу;
- ♦ висока якість зерна;
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспориозу;
- ♦ щільне наповнення качана з напіввідкритими обгортковими пелюстками;
- ♦ міцна рослина і потужна коренева система.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубовидний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендована густота посіву 80–85 тис.зерен/га. Завдяки добрій посухостійкості є лідером за врожайністю зерна в Степовій зоні за результатами випробування.

Тривалість вегетаційного періоду для зони Степу становить 123 дні, для зони Лісостепу — 129 днів.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	4
Висота рослини	3
Ламкість стебла	4
Придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

Кількість рядків зерен	16 - 20
------------------------	---------

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз зерен	5
Фузаріоз стебла	4
Гельмінтоспориоз	3
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2
Стійкість до вилягання	3
Посухостійкість	3
Холодостійкість	1



АЙОВАН

Кукурудза ФАО 350



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ Стабільно висока врожайність
- ◆ Повне наповнення качана
- ◆ Добре сбалансована агрономічна продуктивність

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Реєстрація	2018
Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунта: різні.

Рекомендована густина посіву 80 – 85 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	5
Висота рослини	3
Ламкість стебла	2,5
Днів від висіву до цвітіння	75 - 85
Придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	18 - 22
-----------------------	---------

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Фузаріоз стебла	4
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3
Стійкість до вилягання	2
Посухостійкість	2
Холодостійкість	1



ІНКЛЮЗІВ

Кукурудза ФАО 380



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ дуже високий потенціал врожайності
- ♦ стабільний у різних умовах
- ♦ висока посухостійкість

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Реєстрація	весна 2019
Тип гібриду	простий
Тип зерна	зубоподібний
Використання	зерно

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Тип ґрунта: різні.

Рекомендована густина посіву 80 – 85 тис. зерен/га.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток на початку вегетації	2
Висота рослини	5
Ламкість стебла	2,5
Придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

Гельмінтоспоріоз	2
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2
Стійкість до вилягання	2,5
Посухостійкість	2
Холодостійкість	1

ЯКІСТЬ

Кількість рядів зерен	18 - 22
-----------------------	---------

СОНЯШНИК





ПАТРІЦІЯ КЛ

Соняшник для відкритих місцевостей

Група стиглості: середньо - ранній (115 днів)



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ Положення кошика: напівпідняте
- ◆ Швидке висихання кошика
- ◆ Потенційна врожайність: 40 - 45 ц/га
- ◆ Зони вирощування: степ, лісостеп

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ посівна норма: 6-7 насінин / м²
- ◆ ряди 45см (70см)
- ◆ час посіву: початок квітня
- ◆ збір врожаю: середина - кінець вересня

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Дозрівання	3
Ріст на початку вегетації	2
Висота рослини	170 см
Розмір кошика на момент збору	18 - 20 см
Колір насіння	чорний
Вага насінини	3
Вміст олії	51%

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Біла та сіра гниль	2
Фомоз	1,5
Посухостійкість	2
Стійкість до зламування	1

ПОСІВ ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ:

Норма висіву	6-7 насінин / м ²
Техніка сівби	Відстань між рядками 45-70 см
Час сівби	Початок квітня
Сівозміна	Найкраще між зерновими
Збирання врожаю	Із середини вересня



СІЛУЕТ

Олійний соняшник

Група стиглості: ранньостиглий (110 днів)

Тип гібриду: простий



Сілует – стабільний сорт за врожайністю.

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ відзначається високою посухостійкістю
- ♦ високотолерантний до білої та сірої гнилей та резистентний до переноспорозу
- ♦ потенційна врожайність: 40 - 45 ц/га
- ♦ зони вирощування:

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендована густота на момент збирання 60–65 тис. рослин/га. Вибагливий до родючості ґрунту, при вирощуванні за інтенсивною технологією гарантує високі врожаї.

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Дозрівання	2
Ріст на початку вегетації	2
Висота рослини	150 - 155 см
Розмір кошика на момент збору	20 см
Колір насіння	чорний зі смужками
Вага насінини	1,5
Вміст олії	50 - 52%

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Біла та сіра гниль	2
Фомоз	1,5
Посухостійкість	1
Стійкість до зламування	1

ПОСІВ ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ:

Норма висіву	6-7 насінин / м ²
Техніка сівби	Відстань між рядками 45-70 см
Час сівби	Початок квітня
Сівозміна	Найкраще між зерновими
Збирання врожаю	Із середини вересня

ДЛЯ НОТАТОК:



ЗЕРНОВІ ТА БОБОВІ





СЕРБІНЕТТА

Ярий пивоварний ячмінь

Тривалість вегетаційного періоду для зони Полісся становить 94 дні, для Лісостепу – 85 днів, для Степу – 90 днів.

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока врожайність з найнижчим вмістом білка;
- ♦ відзначається хорошим кушінням;
- ♦ завдяки гарній стійкості до вилягання та толерантності до різних захворювань, сорт пристосований до посушливих, а також до більш вологих територій.

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Ранній посів: 300-350 зерен/м²;
пізній посів: 330-380 зерен/м².

РОСЛИНА:

Группастиглості	середньостиглий
Днів до достигання	85-95
Висота рослини	57-65 см
Колос	двухрядний
Стійкість до осипання	1
Стійкість до полягання	1
Посухостійкість	1,5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Гельмінтоспоріоз	2
Борошниста роса	2
Сажка	1

ХАРАКТЕРІСТИКА ЗЕРНА:

Білок	10%
Екстрактивних речовин	82,1 %



АЗРА (в сортовипробуванні) 6-рядний озимий ячмінь

**Дуже гарні характеристики
рослини**

Дуже хороші розміри зернин

Азра – 6-рядний озимий ячмінь з дуже гарними якостями для тваринницьких господарств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИНИ

висота рослин	5	середньо-висока
стійкість до вилягання	3	дуже висока
стійкість до пошкоджень	3	дуже висока

АГРОНОМІЯ

колос		6-рядний
колосіння	3	дуже раннє
стиглість	5	середня

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

зимостійкість	5	середньо-висока
борошниста	5	середньо-висока
сітчаста	3	дуже висока
ринхоспоріоз	3	дуже висока
бура іржа	5	середньо-висока

ЯКІСТЬ

використання		кормовий ячмінь
вага гектолітра	5	середньо-висока
крупність зерна 2,2 мм	2	дуже висока
крупність зерна 2,5 мм	3	висока
вміст білку	5	середньо-високий
вміст сирого волокна	5	середньо-високий

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

Жорсткі умови **270** **300**

Помірні умови **300** **330**

1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Вересень			Жовтень		
Оптимальний період			Пізній висів має бути проведений із підвищеною нормою висіву зерен.		

Примітка:

Для сортів з раннім висівом в теплу осінь може зростати ризик ураженням тлі чи бурі іржі. Ви можете використовувати обробку інсектицидами чи трохи відкласти строки висіву.



АПОСТЕЛ

(в сортовипробуванні)

Озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ зимостійкість
- ♦ високопродуктивна пшениця А-класу
- ♦ висока врожайність в засушливих регіонах
- ♦ висока стійкість до хвороб та вилягання

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	3	висока
зимостійкість	3	висока
септоріоз листя	4	дуже висока
бура іржа	5	середньо-висока
жовта іржа	2	частково висока
фузаріоз	3	дуже висока
хлортолурун	1	стійкий

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	5	А-клас
питома вага	5	середня
вміст білку	5	середньо-висока
число падіння	4	високе
проростання	3	дуже високе

АГРОНОМІЯ

кокос		безостий
колосіння	4	раннє
стиглість	5	від середньої до високої
висота рослин	3	низька

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

				330	360
1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Вересень			Жовтень		
Оптимальний період			Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

ЕМІЛІО

(в сортовипробуванні)

Озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ дуже високі врожаї
- ♦ ранньостигла
- ♦ дуже хороша зимостійкість
- ♦ гарна стійкість до хвороб

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	5	середня
зимостійкість	2	дуже висока
септоріоз листя	5	середньо-висока
бура іржа	5	середньо-висока
жовта іржа	4	висока
фузаріоз	4	висока
хлортолурун	1	стійка

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	5	Е-клас
питома вага	3	висока
вміст білку	5	середньо-високе
число падіння	4	висока
проростання	2	дуже висока

АГРОНОМІЯ

кокос		остистий
дозрівання	3	дуже раннє
стиглість	3	дуже рання
висота рослин	5	від середньої до високої

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

				330	360
1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Вересень			Жовтень		
Оптимальний період			Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

Примітка:

Рослини з великою густотою стеблостою та імовірністю високого врожаю у регіонах з великою кількістю опадів потребують обробки регулятором росту.



ЕМЕРІНО

М'яка озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ посухостійка
- ♦ зимостійка
- ♦ стресостійка
- ♦ вихід натури: 819

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	5	від середньої до високої
зимостійкість	2	дуже висока
септоріоз листя	5	від середньої до високої
бура іржа	5	від середньої до високої
жовта іржа	4	висока
фузаріоз	5	від середньої до високої
хлортолурун		невідомо

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	5	Е-клас
питома вага	2	дуже висока
вміст білку	5	середньо-високий
число падіння	3	дуже високе
проростання	3	дуже високе

АГРОНОМІЯ

КОЛОС		ОСТИСТИЙ
колосіння	4	раннє
стиглість	3	дуже рання
висота рослин	5	від середньої до високої

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

				330	360
1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Вересень			Жовтень		
Оптимальний період			Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

Примітка:

Емеріно - це стійка пшениця, що може пристосовуватися до стресових умов. Може вирощуватися у регіонах з холодними зимами.

Рослини з великою густотою стеблостою та імовірністю високого врожаю у регіонах з великою кількістю опадів потребують обробки регулятором росту.

ТЕНОР

(в сортовипробуванні)

Озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ ранньостигла
- ♦ високий потенціал врожаю для усіх регіонів
- ♦ хороша стійкість до вилягання

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	3	висока
зимостійкість	5	від середньої до високої
септоріоз листя	5	від середньої до високої
бура іржа	2	частково висока
жовта іржа	2	частково висока
фузаріоз	3	дуже висока
хлортолурун	1	стійка

ЯКІСТЬ

пекарські властивості		В-клас
питома вага	5	від середньої до високої
вміст білку	5	від середньої до високої
число падіння	4	високе
проростання	4	високе

АГРОНОМІЯ

колос		безоста
колосіння	1,5	частково раннє
стиглість	1,5	частково рання
висота рослин	2	дуже низька

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

				300	330	350
1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10
Вересень			Жовтень			Листопад
Оптимальний період		Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов				



ЕРЛ (в сортовипробуванні) Ярий овес

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ дуже ранній
- ♦ високоврожайний
- ♦ відмінна питома вага
- ♦ високі рослини
- ♦ висока стійкість до вилягання

АГРОНОМІЯ

колосіння	4	раннє
стиглість	4	рання

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИНИ

висота рослини	5	від середньої до високої
стійкість до вилягання	4	висока
стійкість до пошкодження стебла	4	висока

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

борошниста роса	5	від середньої до високої
бура іржа	5	від середньої до високої

ЯКІСТЬ

використання	для корму та вимолоту	
питома вага	4	дуже висока
вміст сирого волокна	5	від середнього до високого

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

320			350-400		350-400		
1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	
Березень			Квітень			Травень	
Оптимальний період			Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов				

Примітка:

Ерл можна вирощувати у всіх регіонах для вирощування вівса, а також у регіонах що вимагають ранньої стиглості.



ЕЛІАС (в сортовипробуванні) Озиме жито

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока врожайність
- ♦ висока стійкість до твердої сажки
- ♦ має середньо - високу вагу зерна

АГРОНОМІЯ

тип		лінійний сорт
колосіння	4	раннє
стиглість	4	рання
висота рослини	5	від середньої до високої

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	5	від середньої до високої
проростання	5	від середньої до високої
фузаріоз	5	від середньої до високої
борошниста роса	5	від середньої до високої
іржа на колосі	5	від середньої до високої
іржа на стеблі	5	від середньої до високої
ринхоспоріоз	5	від середньої до високої
тверда сажка	3	дуже висока

ЯКІСТЬ

висота рослин	5	від середньої до високої
питома вага	5	від середньої до високої
вміст білку	5	від середнього до високого
число падіння	4	високе
амілограма	4	висока

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

Жорсткі умови

330 350 380

Помірні умови

300 350

1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Вересень			Жовтень		

Оптимальний
період

Пізній висів має бути проведений із підвищеною нормою висіву зерен.

Примітка:

У регіонах із жорсткими умовами висів має бути завершений до кінця вересня, у регіонах з помірними умовами до початку жовтня.

Регулятори росту слід застосовувати у в місцях з великою густотою рослин та з високим потенціалом врожаю.



КОРНБЕРГЕР (в сортовипробуванні) Просо

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ середньорослі рослини
- ♦ гарна врожайність

ВИКОРИСТАННЯ:

Переважно використовується в якості корму, особливо для птахів. Не підходить для використання в якості крупи для харчової промисловості.

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ

- ♦ Підготовка ґрунту схожа на підготовку перед посівом кукурудзи або цукрових буряків
- ♦ Температура ґрунту має бути не менше 12°C. При занадто ранньому висіві можна втратити частину врожаю. При позньому висіві проростання може затриматись через нестачу вологи у ґрунті
- ♦ Норма висіву 12 - 15 кг/га
- ♦ Від глибини висіву залежить проростання рослини. В залежності від типу ґрунту та його вологості, глибина має становити від 2 см (гарне зволожений) до 4 см (сухий ґрунт)
- ♦ Для отримання густоти рослин 100 - 150 рослин/м² рекомендується висаджувати 15 кг/га насіння
- ♦ Внесення добрив: рекомендується 50N, 50P₂O₅, 80K₂O. В кожному окремому випадку потрібно враховувати стан ґрунту та очікуваний врожай
- ♦ Збір врожаю: кінець серпня - початок вересня



ЛЕСНА

Горох

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ надзвичайно посухостійкий
- ◆ гарна стійкість до вилягання
- ◆ ранні цвітіння та стиглість

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Тип: напівлистяний
- ◆ Колір насінин: жовтий
- ◆ Рекомендації щодо розміщення: також для сухих регіонів
- ◆ Ранньостиглий

РОЗМЩЕННЯ:

Сухий та континентальний клімат

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ◆ Розвиток на початку вегетації: 3
- ◆ Цвітіння: 4
- ◆ Стиглість: 4
- ◆ Висота рослин: 5
- ◆ Стійкість до вилягання: 2
- ◆ Стійкість до коренових захворювань: 4
- ◆ Стійкість до вірусів: 2

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ◆ Потенціал врожаю: 45,8 ц/га
- ◆ Білок: 23%

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ◆ Норма висіву: 100 зерен / м²
- ◆ Час висіву: початок березня
- ◆ Збір врожаю: середина липня



ГЛ МЕЛАНІ

Соя

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ ранньостиглий
- ◆ зерно жовтого кольору

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Використання в харчовій промисловості
- ◆ Розміщення: для піщаного, легкого та середнього ґрунту
- ◆ Стиглість: група 000
- ◆ Тип насінин: жовті

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ◆ Розвиток на початку вегетації: 3
- ◆ Висота рослин: 5
- ◆ Стиглість: 2
- ◆ Вміст олії: ~20,6 %
- ◆ Вміст білку: ~43,3%
- ◆ Вегетація: 105 днів
- ◆ Стійкість до вилягання: 4
- ◆ Стійкість до склеротинії: 4
- ◆ Стійкість до бактерій: 4
- ◆ Стійкість до вірусів: 3
- ◆ Стійкість до розтріскування:

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ◆ Врожайність: 34 ц/га
- ◆ Маса 1000 зерен: ~209 гр
- ◆ Білок: 42,5%

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ◆ Норма висіву: 70 зерен / м²
- ◆ Техніка висіву: висів рядками 45 см (75 см)
- ◆ Час висіву: кінець квітня (10°С у ґрунті)
- ◆ Збір врожаю: початок вересня

Примітка:

Сівозміна: найкраще між зерновими, 5-6 років між соєю та іншими бобовими.



СІЛЬВІЯ ПЗО

Со́я

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ пізня, для сухих регіонів
- ◆ здоровий сорт
- ◆ низька норма висіву

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Розміщення: для піщаного, легкого та середнього ґрунту
- ◆ Група стиглості: 0
- ◆ Тип насінин: жовтий з темно-коричневою плямистістю

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ◆ Розвиток на початку вегетації: 3
- ◆ Висота рослин: 5
- ◆ Стиглість: 5
- ◆ Вміст олії: ~22,1 %
- ◆ Вміст білку: ~39,6 %
- ◆ Вегетація: 131 день
- ◆ Стійкість до вилягання: 4
- ◆ Стійкість до склеротинії: 4
- ◆ Стійкість до бактерій: 5
- ◆ Стійкість до вірусів: 3
- ◆ Стійкість до розтріскування:

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ◆ Врожайність: 40,2 ц/га
- ◆ Маса 1000 зерен: ~ 210 гр
- ◆ Зерен/боб: 3

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ◆ Норма висіву: 50 зерен / м²
- ◆ Техніка висіву: висів рядками 45 см (75 см)
- ◆ Час висіву: кінець квітня (10°С у ґрунті)
- ◆ Збір врожаю: початок жовтня

Примітка:

Сивозміна: найкраще між зерновими, 5-6 років між соєю та іншими бобовими.



АЛЕКСІЯ (в сортовипробуванні) Кінський боб

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ дуже високий потенціал врожаю
- ♦ швидкий розвиток на початку вегетації
- ♦ підходить для посіву в ряди по 45 см

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ♦ Розміщення: підходить для усіх регіонів
- ♦ Використання: на зерно - білковий корм
- ♦ Колір квітки: фіолетовий
- ♦ Наявність таніну: так

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ♦ Розвиток на початку вегетації: 2
- ♦ Висота рослин: 5
- ♦ Стиглість: 4
- ♦ Ламкість стебла: 4
- ♦ Стійкість до вилягання: 2
- ♦ Стійкість до сірої гнилі: 3
- ♦ Стійкість до іржі: 5
- ♦ Стійкість до вірусної інфекції: 1
- ♦ Стійкість до хвороб кореневої системи: 1

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ♦ Потенціал врожайності: 45 ц/га
- ♦ Маса 1000 зерен: ~ 395 гр
- ♦ Вміст білку: ~ 30,5 %

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ♦ Норма висіву: 35 зерен / м²
- ♦ Техніка висіву: висів рядками 45 см
- ♦ Глибина посіву: 6 - 8 см
- ♦ Час висіву: якомога раніше
- ♦ Внесення добрив: 65 кг/Р₂О та 120кг/К₂О

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ

Ми пропонуємо кілька
гібридів та сортів





ГЛЯЙСДОРФЕР ОЛКЮРБІС (сорт)

Голонасінний гарбуз

Середньостиглий

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

Для отримання олії. Олія має темно-зелений колір та є джерелом цинку для організму людини. Також це насіння використовується в кондитерській промисловості при виготовленні різноманітних солодоців.

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендована густота посіву 17-18 тис. зерен/га. Посів проводять пневматичними сівалками точного висіву з міжряддям 70 см на глибину 3-4 см. Посів можна починати при прогріві ґрунту до температури +10...+12°C на глибині загортання насіння. Догляд за посівами полягає в міжрядному обробітку ґрунту та застосуванні гербіцидів. Для отримання високого врожаю застосовують мінеральні добрива з нормою N80P120K180. Для збирання застосовують спеціальні комбайни, які подрібнюють плоди та відмивають насіння. м'якоть с плоду залишається на полі в якості сидератного добрива. Після комбайнування насіннєвий матеріал потребує доочищення методом відмивання та висушування.

РОСЛИНА:

Довжина стебла	10-12 м
Квітка	велика, жовта
Кількість квіток, шт./рослина	2-4 жіночі, 15-20 чоловічі
Плід	округлої форми, помаранчевий з зеленими плямами
Насінина	темно-зелена з тонкою плівковою оболонкою
Маса 1000 шт.	200-220 г
Вміст олії в насінні	48-50%
Вегетаційний період	140-150 днів
Потенціал врожаю	1,3-1,5 т/га сухого насіння

Примітка:

Насіння є джерелом цинку для організму людини. Також це насіння використовується в кондитерській промисловості при виготовленні різноманітних солодоців.

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.





ГЛ КЛАССІК (в сортовипробуванні) Олійний гарбуз

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ великий врожай
- ♦ стійкий до фруктової гнилі

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ♦ походження: | Австрія |
| ♦ тип: | лінійний |
| ♦ цвітіння: | середньо-пізніє |
| ♦ стиглість: | середньо-раннє |
| ♦ стійкість до вірусів: | середня |
| ♦ стійкість до фруктової гнилі: | дуже висока |
| ♦ реєстрація: | Європа |
| ♦ вага зерна: | велика, ~220 гр. |
| ♦ олія (вологі регіони): | ~46,7% |
| ♦ олія (посушливі регіони): | ~45,7% |
| ♦ Потенціал врожаю насіння: | ~1060 кг/га
(вологі регіони)
~880 кг/га
(посушливі регіони) |

НОРМА ВИСІВУ:

~18.000 зерен / га

ТЕХНІКА ВИСІВУ:

Широкі рядки 2,1 – 1,4 м

ЧАС ВИСІВУ:

середина/кінець Квітня

ТИП ҐРУНТУ:

легкі та середні ґрунти, у теплих та сонячних регіонах

СІВОЗМІНА:

найкраще між зерновими

5-6 років між овочами, такими як огірок та цукіні

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ:

Оранка восени

Плоске та чисте поле без бур'янів

ВРОЖАЙ:

Кінець вересня

Примітка:

Врожай має бути достатньо пізнім, для того щоб мати зрілість плодів та легке звільнення зернин від плоду, але в той же час достатньо раннім, перед дощами, що призводять до гниття плодів.

Чутливий до заморозків.

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.



ГЛ РУСТІКАЛ

Олійний гарбуз

Середньостиглий

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ короткі пагони з великою кількістю плодів
- ◆ висока врожайність зерна
- ◆ високий вміст олії
- ◆ помірно стійкий до фруктової гнилі

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Тип: гібрид
- ◆ Використання: олія
- ◆ Рекомендації по розміщенню:
- ◆ Стиглість: середня

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ◆ Розвиток на початку вегетації: 3
- ◆ Цвітіння: 5
- ◆ Стиглість: 5
- ◆ Стійкість до вірусів : 5
- ◆ Стійкість до бактерій: 4
- ◆ Стійкість до борошнистої роси: 5
- ◆ Стійкість до фруктової гнилі: 3
- ◆ Вміст олії: ~47,5%

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ◆ Врожайність насіння: 12 ц/га
- ◆ Маса 1000 зерен: ~216 гр

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ◆ Норма висіву: 18 000 зерен/га
- ◆ Техніка висіву: висів насінин поштучно з дистанцією між 0,7 м та 1,4 м
- ◆ Час висіву: кінець квітня – середина травня
- ◆ Внесення добрив: 0-90 кг N/120 кг P₂O₅/160 кг K₂O
- ◆ Збір врожаю: кінець вересня

Примітка:

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.



ТОВ «РВА Україна»
08130, Україна, Київська область,
Києво-Святошинський район,
село Петропавлівська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 7
тел.: +38 050 492 92 42
www.rwa-ukraine.com.ua