



НАСІННЯ 2021

www.rwa-ukraine.com.ua

ВСТУПНЕ СЛОВО

З 2017 року ТОВ "РВА Україна" є дочірньою компанією "RWA Raiffeisen Ware Austria AG" (RWA). RWA - це історія з багатовіковим європейським досвідом. Однією з основних напрямків діяльності компанії є селекція та виробництво насіння. Крім того, група компаній RWA продає сільськогосподарські продукти та матеріали для виробництва енергії, будівельних матеріалів та виробів для всього будинку та саду. RWA є частиною оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарської техніки та запасних частин.

Ми оптово-сервісна компанія для українських фермерів та інших партнерів у всьому виробничому процесі з насінням. RWA має власну селекцію, виробництво і розподіл насіння. Наша сила - це дослідження та розробка в галузі нових сортів сільськогосподарських культур. Ми пропонуємо на українському ринку насіння кукурудзи, соняшнику, сої, озимої пшениці, озимого ячменю, вівса, гарбуза і різних сумішей трав і т.д.

Крім України RWA-філії розташовані в Словаччині, Угорщині, Словенії, Сербії, Хорватії, Румунії та створені спеціально для збуту наших сортів, гібридів і інших продуктів в цих країнах.

***Генеральний Директор РВА УКРАЇНА,
Др. Дворнік Віталій***

ЗМІСТ

КУКУРУДЗА

ЗУМА	НОВИНКА 2021	5
ОХАННА	НОВИНКА 2021	6
ДУЛКАНО	НОВИНКА 2021	7
ГЕБАЛОТ	НОВИНКА 2021	8
ВАЛАТ	НОВИНКА 2021	9
ДЖЕННІ	НОВИНКА 2021	10
ГЛ 151063	НОВИНКА 2021	11
ЕРВІНГА	НОВИНКА 2021	12
БАЛЕРИНА		13
ЮРЕНГА	НОВИНКА 2021	14
ГЛУМАНДА	НОВИНКА 2021	15
ФОРТЕЗА		16
ЗІРІКУС		17
АЙОВАН		18
ІНКЛЮЗІВ		19

СОНЯШНИК

ПАТРІЦІЯ КЛ	21
СІЛУЕТ	22

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

СЕРБІНЕТТА	25
ЕСКАЛЕНА	НОВИНКА 2021 26

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

АЗРА	НОВИНКА 2021 27
------	-----------------

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

АПОСТЕЛ	НОВИНКА 2021 28
ЕМІЛІО	29
ЕМЕРІНО	30
ТЕНОР	31

ЯРИЙ ОВЕС

ЕРЛ	32
-----	----

ОЗИМЕ ЖИТО

ЕЛІАС	33
-------	----

ПРОСО

КОРНБЕРГЕР	
МІТТЕЛЬФРЮЕ	НОВИНКА 2021 34

ГОРОХ

ЛЕССНА	35
--------	----

СОЯ

ГЛ МЕЛАНІ	36
СІЛЬВІЯ ПЗО	37

КІНСЬКІ БОБИ

АЛЕКСІЯ	НОВИНКА 2021 38
---------	-----------------

ФАЦЕЛІЯ ПИЖМОЛИСТА

ГІФА	НОВИНКА 2021 41
------	-----------------

РІПАК ОЗИМИЙ

ГАЛІЛЕУС	НОВИНКА 2021 42
----------	-----------------

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ

ГЛЯЙСДОРФЕР	45
-------------	----

ОЛКЮРБІС

ГЛ КЛАССІК	НОВИНКА 2021 46
------------	-----------------

ГЛ РУСТІКАЛ	НОВИНКА 2021 47
-------------	-----------------

КУКУРУДЗА



ЗУМА

Кукурудза ФАО 230

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ посухостійкість
- ◆ стійкість проти метелика кукурудзяного
- ◆ стабільна врожайність зерна
- ◆ висока стійкість до гельмінтоспориозу

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **КРЕМЕНИСТОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	3
висота рослини	250 - 270 см
висота кріплення качана	100 - 110 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	1
Гельмінтоспориоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

посухостійкість	2
холодостійкість	2
кількість рядів зерен	18 - 20

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 110/112/115 днів
- ◆ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ОХАННА

Кукурудза ФАО 240

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока та стабільна врожайність зерна
- ♦ швидкий розвиток на початку вегетації
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспоріозу
- ♦ добре пристосований до сухих регіонів

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ♦ ТИП ГІБРИДУ **3-ЛІНІЙНИЙ ГІБРИД**
- ♦ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ♦ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
ламкість стебла	4
висота рослини	250 - 280 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	2
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	16-18

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	4
Гельмінтоспоріоз	3
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П: 108/113/115 днів
- ♦ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ДУЛКАНО

Кукурудза ФАО 250

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ стабільна врожайність зерна
- ◆ висока стійкість до гельмінтоспоріозу
- ◆ стійкість проти метелика кукурудзяного
- ◆ дуже здорові листя і стебло
- ◆ масивна, але не надто висока рослина

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **КРЕМЕНИСТОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	3
висота рослини	230 - 250 см
висота кріплення качана	95 - 100 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	3
Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	3
кількість рядів зерен	14 - 16

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 105/111/116 днів
- ◆ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ГЕБАЛОТ

Кукурудза ФАО 260

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ потужні рослини
- ♦ широкі листя
- ♦ стресостійкий
- ♦ посухостійкий

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ | СЕРЕДНЬОРАННІЙ |
| ♦ ТИП ГІБРИДУ | ПРОСТИЙ |
| ♦ ТИП ЗЕРНА | ЗУБОПОДІБНИЙ |
| ♦ ВИКОРИСТАННЯ | ЗЕРНО |

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	3
ламкість стебла	3
висота рослини	230 - 240 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	3
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	16 - 18

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	2
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 115/118/124 днів
- ♦ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ВАЛАТ

Кукурудза ФАО 260

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ швидкий розвиток на початку вегетації
- ♦ висока стійкість до хвороб
- ♦ посухостійкість
- ♦ високий вміст крохмалю

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ♦ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ♦ ТИП ЗЕРНА **КРЕМЕНИСТОПОДІБНИЙ**
- ♦ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	3
висота рослини	250 - 260 см
висота кріплення качана	95 - 100 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	2
Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	1

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	3
кількість рядів зерен	16

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 109/113/115 днів
- ♦ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ДЖЕННІ

Кукурудза ФАО 260

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ стабільна врожайність зерна
- ◆ висока стійкість до гельмінтоспоріозу
- ◆ стійкий до вилягання

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **КРЕМЕНИСТОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	4
висота рослини	250 - 260 см
висота кріплення качана	95 - 100 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	3
кількість рядів зерен	14-16

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	3
Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	2

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 110/113/115 днів
- ◆ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ГЛ 151063

Кукурудза ФАО 270

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ гарно наповнені качани
- ♦ дуже швидкий розвиток на початку вегетації

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ♦ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ♦ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ♦ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	3
висота рослини	225 - 240 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	3
посухостійкість	4
холодостійкість	2
кількість рядів зерен	16

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	3
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 118/122/124 днів
- ♦ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ЕРВІНГА

Кукурудза ФАО 270

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока врожайність та хороша якість зерна
- ♦ швидкий розвиток на початку вегетації
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспориозу
- ♦ повне наповнення качана

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ♦ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ♦ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОВИДНОПОДІБНИЙ**
- ♦ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
ламкість стебла	3
висота рослини	250 - 260 см
висота кріплення качана	90 - 100 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	3
Гельмінтоспориоз	1
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	2
посухостійкість	2
кількість рядів зерен	16

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 109/113/116 днів
- ♦ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



БАЛЕРИНА

Кукурудза ФАО 280

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ потужний ріст та хороша холодостійкість на ранніх стадіях розвитку
- ♦ посухостійкість завдяки добре розвиненій кореневій системі
- ♦ стійкість до гнилі початків та стебла
- ♦ відмінна вологовіддача, тонка серцевина

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ | СЕРЕДНЬОРАННІЙ |
| ♦ ТИП ГІБРИДУ | ПРОСТИЙ |
| ♦ ТИП ЗЕРНА | ЗУБОПОДІБНИЙ |
| ♦ ВИКОРИСТАННЯ | ЗЕРНО |

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	1
висота рослини	240 - 260 см
висота кріплення качана	90 - 100 см

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	1
кількість рядів зерен	16 - 18

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 113/118/123 днів
- ♦ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га

ЮРЕНГА **НОВИНКА 2021**

Кукурудза ФАО 280



ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ висока врожайність зерна
- ◆ високий вміст крохмалу
- ◆ висока стійкість до гельмінтоспориозу
- ◆ повне наповнення качана

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОРАННІЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **КРЕМЕНИСТО - ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
ламкість стебла	2
висота рослини	260 - 280 см
висота кріплення качана	100 - 110 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Гельмінтоспориоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посуhostійкість	2
кількість рядів зерен	16 - 18

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 110/113/117 днів
- ◆ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ГЛУМАНДА

Кукурудза ФАО 300

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока посухостійкість
- ♦ відмінна стійкість до вилягання
- ♦ потужні коренева система та стебла

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ |
| ♦ ТИП ГІБРИДУ | ПРОСТИЙ |
| ♦ ТИП ЗЕРНА | ЗУБОПОДІБНИЙ |
| ♦ ВИКОРИСТАННЯ | ЗЕРНО |

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
ламкість стебла	2
висота рослини	240 - 260 см
висота кріплення качана	100 - 110 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	3
Гельмінтоспоріоз	2
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	2
псухостійкість	2
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	18 - 22

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 121/125/128 днів
- ♦ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ФОРТЕЗА

Кукурудза ФАО 340

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ якісний гібрид подвійного призначення;
- ♦ адаптований для виробництва біогазу;
- ♦ висока якість зерна;
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспоріозу;
- ♦ щільне наповнення качана з напіввідкритими обгортковими пелюстками;
- ♦ міцна рослина і потужна коренева система

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ |
| ♦ ТИП ГІБРИДУ | ПРОСТИЙ |
| ♦ ТИП ЗЕРНА | ЗУБОПОДІБНИЙ |
| ♦ ВИКОРИСТАННЯ | ЗЕРНО |

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
висота рослини	230 - 250 см
висота кріплення качана	110 - 115 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	1
Гельмінтоспоріоз	1
Пухирчаста сажка	1
Летюча сажка	1

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	1
посухостійкість	2
холодостійкість	2
кількість рядів зерен	16 - 20

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 123/128/133 днів
- ♦ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ЗІРІКУС

Кукурудза ФАО 350

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ якісний гібрид подвійного призначення;
- ♦ адаптований для виробництва біогазу;
- ♦ висока якість зерна;
- ♦ висока стійкість до гельмінтоспоріозу;
- ♦ щільне наповнення качана з напіввідкритими обгортковими пелюстками
- ♦ міцна рослина і потужна коренева система

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ♦ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ**
- ♦ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ♦ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ♦ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	4
ламкість стебла	4
висота рослини	240 - 260 см
висота кріплення качана	110 - 120 см
придатність до монокультури	Придатний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	4
Гельмінтоспоріоз	3
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	3
посухостійкість	3
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	16 - 20

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 123/125/129 днів
- ♦ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



АЙОВАН

Кукурудза ФАО 350

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ Стабільно висока врожайність
- ◆ Повне наповнення качана
- ◆ Добре сбалансована агрономічна продуктивність

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	4
ламкість стебла	3
висота рослини	260 - 280 см
висота кріплення качана	110 - 120 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	2
посуhostійкість	2
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	18 - 22

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз зерен	4
Гельмінтоспоріоз	4
Пухирчаста сажка	3
Летюча сажка	3

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 123/125/129 днів
- ◆ Рекомендована густота посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га



ІНКЛЮЗІВ

Кукурудза ФАО 380

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ дуже високий потенціал врожайності
- ◆ стабільний у різних умовах
- ◆ висока посухостійкість

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ:

- ◆ ГРУПА СТИГЛОСТІ **СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ**
- ◆ ТИП ГІБРИДУ **ПРОСТИЙ**
- ◆ ТИП ЗЕРНА **ЗУБОПОДІБНИЙ**
- ◆ ВИКОРИСТАННЯ **ЗЕРНО**

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
ламкість стебла	2,5
висота рослини	260 - 280 см
придатність до монокультури	Придатний

ЯКІСТЬ

стійкість до вилягання	2
псухостійкість	2
холодостійкість	1
кількість рядів зерен	18 - 22

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Гельмінтоспоріоз	2
Пухирчаста сажка	2
Летюча сажка	2

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 125/128/132 днів
- ◆ Рекомендована густина посіву:
 - посушливі зони: 65 - 70 тис. зерен/га
 - зона достатнього зволоження: 75 - 85 тис. зерен/га

СОНЯШНИК





ПАТРІЦІЯ КЛ

Соняшник

Група стиглості:
ранньостиглий (101 день)

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ положення кошика: напівпідняте
- ◆ швидке висихання кошика
- ◆ потенціал врожайності: 38 - 43 ц/га
- ◆ зони вирощування: степ, лісостеп

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ◆ посівна норма: 6 - 7 насінин/м²
- ◆ ряди 45 см (70 см)
- ◆ час посіву: початок травня
- ◆ збір врожаю: середина - кінець серпня

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

дозрівання	3
ріст на початку вегетації	2
розмір кошика на момент збору	18 - 20 см
колір насіння	чорний
висота рослини	170 см
вміст олії	48 - 50%

ПОСІВ ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

норма висіву	6 - 7 насінин/ м ²
техніка сівби	відстань між рядками 45 - 70 см
час сівби	початок квітня
сівозміна	найкраще між зерновими

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

біла та сіра гниль	2
фомоз	1
посухостійкість	2
стійкість до зламування	1



СІЛУЕТ

Олійний соняшник

Група стиглості:
ранньостиглий (110 днів)

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ відзначається високою посухостійкістю
- ♦ високотолерантний до білої та сірої гнилей та резистентний до переноспорозу
- ♦ потенціал врожайності: 40 - 45 ц/га

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ рекомендована густина на момент збирання 60-65 тис. рослин/га
- ♦ вибагливий до родючості ґрунту, при вирощуванні за інтенсивною технологією гарантує високі врожаї

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

дозрівання	2
ріст на початку вегетації	2
розмір кошика на момент збору	20 см
колір насіння	чорний зі смужками
висота рослини	170 - 180 см
вміст олії	50 - 52 %

ПОСІВ ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ


норма висіву	6 - 7 насінин/ м ²
техніка сівби	відстань між рядками 45 - 70 см
час сівби	початок травня
сівозміна	найкраще між зерновими
збирання врожаю	кінець серпня

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

біла та сіра гниль	2
фомоз	1
посухостійкість	1
стійкість до заламування	1

ДЛЯ НОТАТОК:





ЗЕРНОВІ ТА БОБОВІ



СЕРБІНЕТТА

Ярий пивоварний ячмінь

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ висока врожайність з низьким вмістом білку
- ♦ відзначається хорошим кушінням
- ♦ завдяки гарній стійкості до вилягання та толерантності до різних захворювань, сорт пристосований до посушливих, а також до більш вологих територій

РОСЛИНА

група стиглості	середньо-стиглий
днів до досягання	85-95
висота рослини	57 - 65 см
стійкість до осипання	1
стійкість до вилягання	1
посуhostійкість	1
КОЛОС	двухрядний

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНА

білок	10%
екстрактивних речовин	82,1%

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

гельмінтоспоріоз	2
борошниста роса	2
сажка	1

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 85/90/94 днів
- ♦ Рекомендована густота:
 - для раннього посіву 300 - 350 тис. зерен/м²;
 - для пізнього посіву 330 - 380 тис. зерен/м²



ЕСКАЛЕНА

Ярий ячмінь

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ стійкість до вилягання, осипання, посухи
- ♦ стійкий до хвороб та шкідників
- ♦ хороший потенціал урожайності навіть у сухих умовах

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНА

білок	12,5%
-------	-------

РОСЛИНА

час початку колосіння	ранній
висота рослини	64 - 66 см
стійкість до осипання	1
стійкість до вилягання	1,5
посухостійкість	1
колос	двухрядний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

гельмінтоспоріоз	1,5
брошніста роса	1,5
сажка	1

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 83/88/89 днів



АЗРА

6-рядний озимий ячмінь

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ дуже гарні якості для тваринницьких господарств

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНА

вміст білку	13 %
крупність зерна 2,5 мм	2
вага гектолітра	65 - 68 кг

РОСЛИНА

стійкість до пошкоджень	дуже раннє
колосіння	середня
стиглість	3
висота рослини	80 - 90 см
колос	6-рядний

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

сітчаста плямистість	3
борошниста роса	5
ринхоспоріоз	3
бура іржа	5



АПОСТЕЛ

Озима пшениця

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ зимостійкість
- ◆ високопродуктивна пшениця А-класу
- ◆ висока врожайність в засушливих регіонах
- ◆ висока стійкість до хвороб та вилягання

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колос	безостий
колосіння	2
стиглість	3
висота рослин	80 - 90 см

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

	330	360
1-10	11-20	21-31
Жовтень		
Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	1
зимостійкість	2
септоріоз листя	1
бура іржа	2
жовта іржа	2
фузаріоз	1

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	1
питома вага	3
вміст білку	14 %
число падіння	2
проростання	1



ЕМІЛІО

(в сортовипробуванні)

Озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ високоврожайна
- ♦ ранньостигла
- ♦ дуже хороша зимостійкість
- ♦ гарна стійкість до хвороб

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

КОЛОС	ОСТИСТИЙ
КОЛОСІННЯ	1
СТИГЛІСТЬ	1
ВИСОТА РОСЛИН	85 - 95 см

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

	330	360
1-10	11-20	21-31
Жовтень		
Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	3
зимостійкість	1
септоріоз листя	3
бура іржа	3
жовта іржа	2
фузаріоз	2

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	4
питома вага	2
вміст білку	2
число падіння	2
проростання	1

Примітка:

Рослини з великою густотою стеблостою та імовірністю високого врожаю у регіонах з великою кількістю опадів потребують обробки регулятором росту.



ЕМЕРІНО

М'яка озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ посухостійка
- ♦ зимостійка
- ♦ стресостійка
- ♦ вихід натури: **819**

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	4
зимостійкість	1
септоріоз листя	4
бура іржа	4
жовта іржа	3
фузаріоз	4

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колос	ОСТИСТИЙ
колосіння	3
стиглість	2
висота рослин	95 - 100 см

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

	330	360
1-10	11-20	21-31
Жовтень		
Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	4
клейковина	31,5 %
вміст білку	14,5 %
число падіння	2
проростання	2

Примітка:

Рослини з великою густотою стеблостою та імовірністю високого врожаю у регіонах з великою кількістю опадів потребують обробки регулятором росту.



ТЕНОР

Озима пшениця

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ ранньостигла
- ♦ високий потенціал врожаю для всіх регіонів
- ♦ хороша стійкість до вилягання

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колос	безостий
колосіння	1,5
стиглість	1,5
висота рослин	60 - 75 см

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

	300	330
1-10	11-20	21-31
Жовтень		
Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	2
зимостійкість	3
септоріоз листя	3
бура іржа	2,5
жовта іржа	2,5
фузаріоз	1

ЯКІСТЬ

пекарські властивості	2
питома вага	3
вміст білку	13 %
число падіння	2
проростання	2



ЕРЛ Ярий овес

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ дуже ранній
- ◆ високоврожайний
- ◆ відмінна питома вага
- ◆ високі рослини
- ◆ висока стійкість до вилягання

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колосіння	1
стиглість	1

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

борошниста роса	3
бура іржа	3

ХАРАКТЕРИСТИКА

висота рослини	3
стійкість до вилягання	1
стійкість до пошкодження стебла	1

ВИСІВ (ЗЕРЕН/М²)

320		350 - 400
1-10	11-20	21-31
Березень		
Оптимальний час висіву залежить від початку вегетації та умов ґрунту.		

ЯКІСТЬ

питома вага	1
вміст сирого волокна	2
використання	для корму та вимолоту

НОВИНКА 2021



ЕЛІАС

Озиме жито

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ врожайність 45 - 55 ц/га
- ♦ висока стійкість до твердої сажки
- ♦ має середньо - високу вагу зерна

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колосіння	1
стиглість	1
висота рослини	2
тип	лінійний сорт

ЯКІСТЬ

висота рослини	2
питома вага	2
вміст білку	2
число падіння	1
амілограма	1

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість до вилягання	4
проростання	4
фузаріоз	4
борошниста роса	4
іржа на колосі	4
іржа на стеблі	4
ринхоспоріоз	4
тверда сажка	3



КОРНБЕРГЕР МІТТЕЛЬФРЮЕ

Просо

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ група стиглості: середньоранній
- ♦ середньорослі рослини
- ♦ гарна врожайність
- ♦ стійкий до хвороб

ВИКОРИСТАННЯ

- ♦ Використовується в якості корму для птахів та в якості крупи для харчової промисловості.

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ

- ♦ Підготовка ґрунту схожа на підготовку перед посівом кукурудзи або цукрових буряків
- ♦ Температура ґрунту має бути не менше 12°C. При занадто ранньому висіві можна втратити частину врожаю. При пізньому висіві проростання може затриматись через нестачу вологи у ґрунті
- ♦ Норма висіву 12 - 15 кг/га
- ♦ Від глибини висіву залежить проростання рослини. В залежності від типу ґрунту та його вологості, глибина має становити від 2 см (гарне зволожений) до 4 см (сухий ґрунт)

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- ♦ Для отримання густоти рослин 100 - 150 рослин/м2 рекомендується висаджувати 15 кг/га насіння
- ♦ Внесення добрив: рекомендується 50N, 50P₂O₅, 80K₂O. В кожному окремому випадку потрібно враховувати стан ґрунту та очікуваний врожай
- ♦ Збір врожаю: кінець серпня - початок вересня

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

стійкість до вилягання	3
стійкість до осипання	1
стійкість до посухи	1
висота рослини	95 - 120 см
вміст білку	13,5%

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

бактеріоз плямистий	1
сажка	1
просяний комарик	1



ЛЕССНА

Горox

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ надзвичайно посухостійкий
- ◆ гарна стійкість до вилягання
- ◆ ранні цвітіння та стиглість

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Тип: напівлистяний
- ◆ Колір насінин: жовтий
- ◆ Рекомендації щодо розміщення: також ждя сухих регоінів
- ◆ Ранньостиглий
- ◆ Розміщення: сухий та континетальний клімат

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
цвітіння	3
стиглість	3
стійкість до вилягання	1
стійкість до корневих захворювань	3
стійкість до вірусів	3

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- ◆ Потенціал врожаю: 45,8 ц/га
- ◆ Білок: 23,9 %

ВИРОЩВАННЯ СОРТУ

- ◆ Норма висіву: 100 зерен / м²
- ◆ Час висіву: початок березня
- ◆ Збір врожаю: середина липня



ГЛ МЕЛАНІ

Соя

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ ранньостиглий
- ◆ зерно жовтого кольору

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ

- ◆ Використання в харчовій промисловості
- ◆ Розміщення: для піщаного, легкого та середнього ґрунту
- ◆ Група стиглості: 000

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	3
стиглість	2
стійкість до вилягання	4
стійкість до розтріскування	3
висота рослини	60 - 80 см
вегетація	98 днів

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

склеротинія	4
бактерії	4
віруси	3

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

врожайність	34 ц/га
маса 1000 зерен	~ 209 гр
вміст білку	42,5 %
вміст олії	13,5%

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ

- ◆ Норма висіву: 70 зерен / м²
- ◆ Техніка висіву: висів рядками 45 см (75 см)
- ◆ Час висіву: кінець квітня (10°С у ґрунті)
- ◆ Збір врожаю: початок вересня



СІЛЬВІЯ ПЗО

Соя

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ пізня, для сухих регіонів
- ◆ низька норма висіву

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ

- ◆ Розміщення: для піщаного, легкого та середнього ґрунту
- ◆ Група стиглості: 0
- ◆ Тип насінин: жовтий з темно-коричневою плямистістю

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	3
стиглість	4
стійкість до вилягання	4
стійкість до розтріскування	3
висота рослини	4
вегетація	131 день

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

склеротинія	4
бактерії	4
віруси	3

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

врожайність	40,2 ц/га
маса 1000 зерен	~ 210 гр
зерен/бобів	3
вміст білку	~ 39,6 %
вміст олії	~ 22,1 %

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ

- ◆ Норма висіву: 50 зерен / м2
- ◆ Техніка висіву: висів рядками 45 см (75 см)
- ◆ Час висіву: кінець квітня (10°С у ґрунті)
- ◆ Збір врожаю: початок жовтня



АЛЕКСІЯ

Кінський біб

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ дуже високий потенціал врожаю
- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ підходить для посіву в ряди по 45 см

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ

- ◆ Розміщення: підходить для усіх регіонів
- ◆ Використання: на зерно - білковий корм
- ◆ Колір квітки: фіолетовий
- ◆ Наявність таніну: так

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

розвиток на початку вегетації	2
стиглість	4
ламкість стебла	4
стійкість до вилягання	2
висота рослини	4

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

сіра гниль	3
іржа	4
вірусна інфекція	4
хвороби кореневої системи	3

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/ СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

врожайність	45 ц/га
маса 1000 зерен	~ 395 гр
вміст білку	30,5 %

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ

- ◆ Норма висіву: 35 зерен / м²
- ◆ Техніка висіву: висів рядками 45 см
- ◆ Глибина посіву: 6 - 8 см
- ◆ Час висіву: якомога раніше
- ◆ Внесення добрив: 65 кг/Р₂О та 120кг/К₂О

ДЛЯ НОТАТОК:

[illegible]

РІПАК ТА ФАЦЕЛІЯ

Ми пропонуємо новий гібрид
ріпаку та фацелії





ГІФА

Фацелія пижмолиста

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ швидкий розвиток на початку вегетації
- ◆ стійка до вилягання
- ◆ висота рослини середьоросла
- ◆ забарвлення насіння коричневе
- ◆ стійка проти хвороб
- ◆ ідеальний екологічно - чистий сидерат

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

стійкість проти шкідників	1
зимостійкість	1
морозостійкість	1

ВЛАСТИВОСТІ

Фацелія стійка до хвороб та шкідників (нематода, личинки т.ін.).

Вона здатна захистити культури, що ростуть поряд (гербіцидні властивості).

- ◆ покращує структуру ґрунту та збагачує її поживними речовинами
- ◆ за рахунок високої зимостійкості, можна висівати як осінні посіви сидерату



ГАЛІЛЕУС

Ріпак озимий

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ стійкість до вилягання, осипання, посухи
- ♦ стійка до хвороб та шкідників
- ♦ високий вміст олії та білка
- ♦ швидкий розивток на початку вегетації

АГРОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

висота рослини	110 - 120 см
початок вегетації	ранній

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ УМОВ

пильщик ріпаковий	1
квіткоїд ріпаковий	3
переноспероз	3

РОСЛИНА

стійкість до осипання	2
стійкість до вилягання	1
посухостійкість	2
зимостійкість	1

ЯКІСТЬ

вміст білку	20%
вміст олії	46%

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- ♦ Типи ґрунтів - різні
- ♦ Тривалість вегетаційного періоду становить С/Л/П - 280/280/305 днів

ДЛЯ НОТАТОК:

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

ОЛІЙНИЙ ГАРБУЗ

Ми пропонуємо кілька
гібридів та сортів





ГЛЯЙСДОРФЕР ОЛКЮРБІС (сорт)

Голонасінний гарбуз

Середньостиглий

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

Для отримання олії. Олія має темно-зелений колір та є джерелом цинку для організму людини. Також це насіння використовується в кондитерській промисловості при виготовленні різноманітних солодощів.

АГРОТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендована густина посіву 17-18 тис. зерен/га. Посів проводять пневматичними сівалками точного висіву з міжряддям 70 см на глибину 3-4 см. Посів можна починати при прогріві ґрунту до температури +10...+12°C на глибині загортання насіння. Догляд за посівами полягає в міжрядному обробітку ґрунту та застосуванні гербіцидів. Для отримання високого врожаю застосовують мінеральні добрива з нормою N80P120K180. Для збирання застосовують спеціальні комбайни, які подрібнюють плоди та відмивають насіння. М'якоть з плоду залишається на полі в якості сидератного добрива. Після комбайнування насіннєвий матеріал потребує доочищення методом відмивання та висушування.

РОСЛИНА:

Довжина стебла	10-12 м
Квітка	велика, жовта
Кількість квіток, шт./рослина	2-4 жіночі, 15-20 чоловічі
Плід	округлої форми, помаранчевий з зеленими плямами
Насінина	темно-зелена з тонкою плівковою оболонкою
Маса 1000 шт.	200-220 г
Вміст олії в насінні	48-50%
Вегетаційний період	140-150 днів
Потенціал врожаю	1,3-1,5 т/га сухого насіння

Примітка:

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.





ГЛ КЛАССІК

Олійний гарбуз

НОВИНКА 2021

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ♦ великий врожай
- ♦ стійкий до фруктової гнилі

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ♦ тип: | лінійний |
| ♦ цвітіння: | середньо-пізнє |
| ♦ стиглість: | середньо-рання |
| ♦ стійкість до вірусів: | середня |
| ♦ стійкість до фруктової гнилі: | дуже висока |
| ♦ вага зерна: | велика, ~220 гр. |
| ♦ олія (вологі регіони): | ~46,7% |
| ♦ олія (посушливі регіони): | ~45,7% |
| ♦ Потенціал врожаю насіння: | ~1060 кг/га
(вологі регіони)
~880 кг/га
(посушливі регіони) |

НОРМА ВИСІВУ:

~18.000 зерен / га

ТЕХНІКА ВИСІВУ:

Широкі рядки 2,1 – 1,4 м

ЧАС ВИСІВУ:

середина/кінець Квітня

ТИП ҐРУНТУ:

легкі та середні ґрунти, у теплих та сонячних регіонах

СІВОЗМІНА:

найкраще між зерновими
5-6 років між овочами, такими як огірок та цукіні

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ:

Оранка восени
Плоске та чисте поле без бур'янів

ВРОЖАЙ:

Кінець вересня

Примітка:

Врожай має бути достатньо пізнім, для того щоб мати зрілість плодів та легке звільнення зернин від плоду, але в той же час достатньо раннім, перед дощами, що призводять до гниття плодів.

Чутливий до заморозків.

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.



ГЛ РУСТІКАЛ

Олійний гарбуз
Середньостиглий

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- ◆ короткі пагони з великою кількістю плодів
- ◆ висока врожайність зерна
- ◆ високий вміст олії
- ◆ помірно стійкий до фруктової гнилі

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ:

- ◆ Тип: гібрид
- ◆ Використання: олія
- ◆ Рекомендації по розміщенню: теплі, вологі регіони
- ◆ Стиглість: середня

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ◆ Розвиток на початку вегетації: 3
- ◆ Цвітіння: 5
- ◆ Стиглість: 5
- ◆ Стійкість до вірусів : 5
- ◆ Стійкість до бактерій: 4
- ◆ Стійкість до борошнистої роси: 5
- ◆ Стійкість до фруктової гнилі: 3
- ◆ Вміст олії: ~47,5%

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ/СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

- ◆ Врожайність насіння: 12 ц/га
- ◆ Маса 1000 зерен: ~216 гр

ВИРОЩУВАННЯ СОРТУ:

- ◆ Норма висіву: 18 000 зерен/га
- ◆ Техніка висіву: висів насінин поштучно з дистанцією між 0,7 м та 1,4 м
- ◆ Час висіву: кінець квітня – середина травня
- ◆ Внесення добрив: N/0-90 кг P_2O_5 120 кг/160 кг K_2O
- ◆ Збір врожаю: кінець вересня

Примітка:

Для отримання очікуваного врожаю опади за період вегетації повинні становити мінімум 250 мм.

ДИСТРИБ'ЮТОРИ РВА УКРАЇНА




КОНТАКТНІ ОСОБИ РВА УКРАЇНА



Др. Дворнік Віталій
Генеральний директор

тел.: +38 050 492 92 42
vitaliy.dvornik@rwa-ukraine.com.ua



Андрієвський Олександр

Менеджер з логістики
тел.: +38 050 465 91 35
oleksandr.andrievskiy@rwa-ukraine.com.ua



Васильєв Василь
Менеджер з продажу насіння

тел.: +38 099 222 53 63
vasyl.vasiliev@rwa-ukraine.com.ua



Дубовий Олексій

Бухгалтер
тел.: +38 068 155 44 44
oleksii.dubovoi@rwa-ukraine.com.ua



Воловик Галина
Менеджер з реєстрації сортів рослин

тел.: +38 066 878 88 13
galina.volovik@rwa-ukraine.com.ua

ПЕРЕЛІК СОРТІВ У СОРТОВИПРОБУВАННІ

- ♦ Ячмінь ярий
- ♦ Овес ярий
- ♦ Люцерна посівна
- ♦ Гречка їстівна
- ♦ Соя
- ♦ Гірчиця біла
- ♦ Пшениця м'яка дворучка
- ♦ Сорго звичайне (двокольорове)
- ♦ Льон звичайний довгунець
- ♦ Тритикале озиме
- ♦ Жито озиме
- ♦ Ячмінь озимий
- ♦ Пшениця озима

ШКАЛА БАЛІВ

1	дуже високий/швидкий/здоровий
2	дуже високий/швидкий/здоровий
3	високий/швидкий/здоровий
4	від високого/швидкого/здорового до середнього
5	середній
6	від середнього до низького/повільного/чутливого до хвороб
7	низький/повільний/чутливий до хвороб
8	дуже низький/повільний/чутливий до хвороб
9	дуже низький/повільний/чутливий до хвороб

ДЛЯ НОТАТОК:

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of ten sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

[illegible]



ТОВ «РВА Україна»
08129, Україна, Київська область,
Києво-Святошинський район,
село Петропавлівська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 7
тел.: +38 050 492 92 42
www.rwa-ukraine.com.ua